

FILISTATA GRANDIDIERI SP. NOV. Araignée cavernicole de Madagascar,
PAR M. E. SIMON, CORRESPONDANT DU MUSÉUM.

L'Arachnide, dont nous donnons la description sous le nom de *Filistata Grandidieri*, a été découvert par M. G. Grandidier dans la grotte de Sarandon (côte orientale de Madagascar) et est jusqu'ici, au moins pour les Arachnides, le seul représentant connu de la faune hypogée à Madagascar.

Les autres espèces du genre *Filistata*, répandues dans toutes les régions chaudes du monde, ont des habitudes lucifuges; l'espèce cavernicole de Madagascar s'en distingue surtout par ses téguments incolores et ses pattes très fines et longues, rappelant celles des *Pholcus*, tandis que ses pattes-mâchoires sont relativement assez courtes et robustes; ses yeux, bien développés, ne paraissent pas avoir subi de modifications.

Filistata Grandidieri sp. nov.

♀ Long., 3 millim. 5.

Pallide lutea subpellucens, area oculorum in medio transversim nigra, abdomine cinereo, longe sed parce albido-piloso, pedum-maxillarium tarso rufoluto-tincto. Cephalothorax breviter ovatus, lœvis, parcissime pilosus, regione oculari leviter elevata setos albidis erectis et obtusis ornata. Oculi aream feré duplo latiorum quam longiorem occupantes, quatuor antici a se contigui, in lineam valde procurvam, medii, nigri et rotundi, lateralibus, abbis et late ovatis, saltem duo minores. Oculi postici ovati, utrinque contigui inter se subæquales sed lateribus anticis paulo minores. Clypeus valde proclivis; attenuatus atque obtusus, area oculorum latior. Abdomen oblongum, postice rotundum. Pedes tenues et longi, omnino mutici. Pedes-maxillares crassi, femore setis longis, parum regulariter biseriatis, subtus munito, tibia subtus crebre sed inordinate pilosa, tarso leviter ovato. Calamistrum breve biseriatum, serie superiore inferiore crassiore.

♂ Long., 3 millim. 5.

A femina differt pedibus, præsertim anticis, tenuibus et longissimis fere *Pholci*, fibiis si paris aculeorum paribus trinis, 1^{er} mediana; reliquis in parte apicali sitis, armatis metatarsi si paris aculeo setiformi subbarilari munitis, reliquis articulis muticis. Pedes-maxillares modice longi; femore leviter curvato; patella parva; tibia patella plus duplo longiore, cylindracea, apicem versus sensim et vix ampliata et apice longe pilosa; tarso parvo nodiformi; bulbo fusco-rufulo, angusto, longe attenuato atque acuto. — In spelunca Sarandoni dicta (G. Grandidier).